

Guía de las aves de Sarriegos





Cigüeña blanca *Ciconia ciconia* 

Ave de gran tamaño, combina el color negro y blanco de las alas, el blanco del cuerpo, con patas y pico de color rojo en los adultos, en los jóvenes estos son de color negruzco. Habita zonas abiertas de riberas de ríos y arroyos, con cultivos y prados. Se alimenta de anfibios, reptiles, cangrejos y roedores, aunque también es frecuente verla alimentándose en vertederos.

Cría en nidos aislados o formando colonias. Construye grandes nidos, a base de ramas, sobre postes y torretas de la luz, así como sobre edificios o árboles. La reproducción comienza en el mes de febrero y las puestas durante la primera quincena del mes de marzo. Normalmente la hembra pone de dos a tres huevos y en el mes de junio los pollos ya comienzan a volar.



A finales de julio realiza un viaje migratorio hacia el sur del desierto del Sáhara, aunque cada vez es más frecuente que este viaje sea más corto y escoja algunos lugares del sur de la Península, y del norte de África para pasar el invierno.

REP EST INV MON W RIB Ratonero común *Buteo buteo*

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Rapaz de tamaño mediano con plumaje de colores pardos y moteado blanco, tiene un babero claro que se observa cuando se encuentra posado. La patas y la parte superior del pico son amarillentos. Aparece en gran cantidad de lugares, siempre que existan árboles en los que construir su nido, con cultivos o claros cercanos donde poder cazar desde altos posaderos. Comienza a criar en el mes de marzo y se alimenta de roedores, insectos y pequeños reptiles. Es una especie que permanece todo el año y que aumenta su población durante el invierno, ya que recibe individuos europeos que pasan el invierno en la Península.



Cernicalo vulgar *Falco tinnunculus* REP EST INV MON W RIB

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Pequeña rapaz de colores pardos, con motas negras. En el macho la cabeza y las alas tienen tonos azules, mientras que la hembra es totalmente parda. Ocupa diferentes ambientes, desde llanuras hasta alta montaña, prefiriendo las zonas abiertas agrícolas, con árboles dispersos. Caza insectos y roedores que observa desde el aire, cerniéndose sobre ellos. Cría en árboles y en agujeros de cortados y edificios antiguos. Las puestas comienzan a finales de abril y mayo y permanece todo el año en la Península.



REP EST MON RIB AGR **Cuco común *Cuculus canorus***

enero febrero marzo **abril** mayo junio julio agosto **septiembre** octubre noviembre diciembre

Ave popular de montes y riberas que delata su llegada en primavera con su inconfundible reclamo "cucú". Es de color gris azulado, con las partes inferiores claras barradas de oscuro. Es una excelente ave insectívora y llama la atención su singular modo de cría, consistente en poner sus huevos en los nidos de otras aves, que luego crían estos pollos como propios.



Perdiz roja *Alectoris rufa* REP EST NV MON AGR

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto **septiembre** octubre noviembre diciembre



Ave que ocupa montes y tierras de cultivo. Plumaje de colores pardos y rojizos que contrastan con sus laterales, más claros y con líneas negras. El pecho es gris azulado y las patas y pico de color rojo. Se alimenta de granos e insectos. Es una especie muy ágil que sale corriendo ante cualquier señal de peligro. Posee un vuelo corto pero potente.

REP REST INV MON W RIB Pito real *Picus viridis*

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Pájaro carpintero, de llamativo color verdoso con la parte superior de la cabeza y nuca de color rojo. Ocupa las zonas con árboles, donde se puede ver volando y trepando por los troncos. Se alimenta de insectos y las larvas de éstos que captura en los troncos de los árboles y en el suelo. El nido lo realiza en un agujero en el interior de viejos árboles.



Pico picapinos *Dendrocopos major* REP REST INV MON W RIB

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Pájaro carpintero con plumaje negro y blanco. En él destacan la nuca y la parte inferior de la base de la cola que son de color rojo. El vuelo es ondulante y se le puede ver sobre los troncos en busca de comida: insectos, larvas y savia, los cuáles extrae perforando la corteza con su poderoso pico. Cuando se alimenta produce un tamborileo muy llamativo que se puede escuchar desde muy lejos. Cria en los troncos de los grandes árboles, en agujeros que él mismo realiza.



REP EST INV RIB AGR Golondrina común *Hirundo rustica*

enero febrero **marzo** abril mayo junio julio agosto septiembre octubre **noviembre** diciembre

Posee un color negro con reflejos metálicos azulados en las partes superiores. Las partes inferiores son de colores crema y la garganta es de color rojo. Tiene la cola ahorquillada y las alas largas y apuntadas. Se alimenta de insectos que captura en vuelo. Cria en nidos hechos con barro, en el interior de los pueblos.



Chochín *Troglodytes troglodytes* REP EST INV RIB

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre



Es un pequeño pájaro rechoncho de color pardo, barredado de oscuro con partes inferiores más claras. Tiene un pico largo y fino, y cola corta y recta. Habita los sotos de las riberas, en zarzas, espinos y otros matorrales. Se alimenta de insectos y construye el nido con hierbas, hojas y musgo, muy cerca del suelo.



Petirrojo *Erithacus rubecula*

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Tiene tonos marrones en las partes superiores y blanco en las inferiores. Tiene un llamativo y extenso babero naranja. Es una especie que se alimenta de insectos y frutos, que ante la presencia humana no duda en acercarse a curiosear. El canto es un llamativo gorjeo, con cortos trinos. Construye un nido a base de hierbas finas y secas, en zonas muy espesas de matorrales.



Colirrojo tizón *Phoenicurus ochruros*



enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Se puede observar en los pueblos. El macho es de colores oscuros que contrastan con las partes inferiores de tonos más blancos y la cola roja. La hembra y los jóvenes, por el contrario, presentan tonos pardos con la característica cola rojiza. Se alimenta de insectos que caza al vuelo o en el suelo, y construye el nido en huecos.



REP EST INV MON RIB AGR Mirlo común *Turdus merula*

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Aparece en gran cantidad de zonas con arbustos, como prados, parques o huertos. De color negro, es muy llamativo su pico y anillo ocular de color amarillo. Cria en setos y arbustos. Construye un nido de hierbas y ramillas que acolcha con pelos y lana.



Tarabilla común *Saxicola torquata* REP EST INV MON

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Ave insectívora. El macho tiene la cabeza, garganta y espalda de color negro que contrasta con su pecho anaranjado. La hembra, por el contrario, es de color pardo con un abundante moteado. Habita todo tipo de zonas abiertas con matorral como laderas de montes o zonas agrícolas.

REP EST INV MON RIB Curruca capirotada *Sylvia atricapilla*

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Se alimenta de insectos y frutos. De colores grises, con un capirote negro el macho y marrón en la hembra. Frecuenta los sotos de los ríos con gran cantidad de arbustos, así como parques y jardines. Nidifica entre los arbustos, en los que construye su nido.



REP  EST  NV  MON  RIB **Carbonero común *Parus major***

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Tiene la cabeza y un babero de color negro con una llamativa mejilla de color blanco. El cuerpo es amarillento. Se alimenta de insectos y frutos y es frecuente verla en parques, huertos, jardines y riberas.



Herrerillo común *Parus caeruleus* REP  EST  NV  MON  RIB

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Ave de pequeño tamaño y llamativos colores azules en las alas, espalda y cabeza. El pecho y vientre son amarillentos y el resto de la espalda verdosa. Se alimenta de insectos y frutos y se le puede ver colgándose de las ramas de los árboles de riberas bosques y parques.



REP  EST  NV  MON  RIB **Mito *Aegithalos caudatus***

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Pájaro muy pequeño con máscara y cuerpo de colores negros y grises, con tonos rosáceos en los laterales y las alas. Tiene una larga cola. Es una especie insectívora que puede ser observada en riberas y bosques emitiendo un reclamo a modo de un suave silbido.



REP EST NV AGR Estornino negro *Sturnus unicolor*

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Comúnmente llamado tordo. Es de color negro con brillos metálicos, aunque las patas y la mitad anterior del pico son amarillentos. Ocupa los alrededores de ciudades y pueblos, donde forma grandes bandos. Se alimenta principalmente de insectos y frutos.



REP EST NV MON AGR IB Pinzón vulgar *Fringilla coelebs*

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

La hembra es verde grisácea, con una franja blanca en el ala. El macho tiene colores rosáceos en el cuerpo y tonos azules en la cabeza, con las franjas de las alas y los hombros blancos. Se alimenta de granos y frutos, además de brotes de numerosas plantas.



REP EST NV AGR Pardillo común *Carduelis cannabina*

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Ave de color pardo y cabeza gris, con bandas alares blancas. El macho, durante la época de cría, tiene tonos rojos en pecho y frente. Habita zonas agrícolas con árboles y arbustos. Se alimenta de semillas e insectos y es muy común verle posado sobre el suelo.





Escribano hortelano *Emberiza hortulana*

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

El macho tiene la cabeza, cuello y babero de color verde grisáceo, y bigoterías y mentón de color amarillento. El pecho y las partes inferiores son de color pardo rosáceo. La hembra es similar, pero de colores más apagados. Se puede observar en sotos, zonas de sebes y bordes de robledales con cultivos y zonas húmedas.



Escribano montesino *Emberiza cia*



enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

El macho tiene babero y cabeza gris con bigoterías, listas oculares y parte superior de la cabeza de color negro. El pecho y partes inferiores, así como las superiores de la espalda, son de tonos rojizos. La hembra es muy similar de colores más apagados. Habita zonas de ladera con matorral o árboles dispersos y se alimenta de insectos y semillas.



Triguero *Miliaria calandra*



enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Ave de tamaño grande posee tonos pardos, moteado de negro en los flancos y en el pecho, y con bigoterías negras. Se la reconoce bien por su reclamo: potente y sonoro a modo de notas gorjeantes y traqueteos. Se alimenta de semillas, frutos y brotes, y habita lugares abiertos, cultivados, con herbazales y con matorral escaso y disperso.



En el municipio de Sariegos contamos con varias zonas con una gran riqueza ornitológica: la vega del río Bernesga, las zonas de monte que encontramos según nos alejamos del río tanto hacia el este como hacia el oeste o, en medio, las eras y choperas. La pequeña guía que tenéis en las manos os ayudará a reconocer las aves que veáis en vuestras excursiones. ¡Que lo disfrutéis!

Vuestro alcalde,
Juan Carlos Hidalgo.

Entidades colaboradoras



Subvenciona

